

Con il patrocinio di



Corso FAD ECM

AGGIORNAMENTI NELLE TERAPIE della dipendenza da oppiacei *e patologie correlate*

3
CREDITI
FORMATIVI
ECM

Responsabile Scientifico: Claudio Leonardi

ONLINE FINO AL
15 2021
Settembre



AGGIORNAMENTI NELLE TERAPIE della dipendenza da oppiacei e patologie correlate

Razionale Scientifico

La terapia della costipazione indotta da oppioidi

La stipsi indotta dall'uso terapeutico degli oppioidi rappresenta uno degli effetti avversi più comuni derivanti dall'uso di questi farmaci e ha un forte impatto sulla compliance del paziente, sulla sua aderenza alla terapia e, soprattutto, sulla sua qualità di vita. È un problema non ancora completamente risolto non solo nei pazienti sottoposti a terapia con oppioidi a scopo antalgico, ma e soprattutto nei pazienti affetti da disturbo da uso di oppioidi.

I trattamenti oggi disponibili per la gestione della stipsi indotta da oppioidi sono basati sull'impiego dei lassativi convenzionali (lassativi idrofili, emollienti, osmotici e di contatto), che spesso non garantiscono dei risultati accettabili in molti pazienti, limitandone la qualità di vita.

Gli obiettivi del trattamento della stipsi indotta da oppioidi sono quelli di eliminare e/o ridurre le sensazioni di dolore e disagio se presenti, riacquistare una fisiologica funzionalità intestinale e prevenire l'occorrenza di altri sintomi come nausea, vomito, tensione, dolore addominale e nei casi più gravi l'occlusione intestinale.

La prevenzione e la cura della disfunzione intestinale indotta da oppioidi si può avvalere oggi anche dell'uso degli antagonisti periferici del recettore mu degli oppioidi (Peripherally Acting Mu-Opioid Antagonist -PAMORA) in grado di antagonizzare gli effetti indesiderati dei farmaci oppioidi a livello intestinale senza comprometterne l'efficacia clinica dal momento che non sono in grado di attraversare la barriera ematoencefalica.

Scopo di questo corso è di illustrare i meccanismi fisiopatologici e dinamici che governano la funzione intestinale, la loro alterazione durante la terapia con oppioidi e i trattamenti di elezione per il controllo efficace della stipsi.

L'uso del levometadone

La forma racemica del metadone attualmente in uso presso la maggior parte dei SerD italiani, è costituita dalla miscela di destrometadone e levometadone. Il levometadone presenta un'affinità recettoriale per i recettori μ 10 volte maggiore del destrometadone e una potenza analgesica 50 volte maggiore. Pertanto la miscela racemica ha un'attività terapeutica potremo dire "diluata" per la presenza del d-metadone. Il levometadone ha un'emivita più lunga rispetto al metadone racemo. La dose efficace del levometadone è pari al 50% del metadone.

L'utilizzo di levometadone:

- 1) riduce significativamente l'uso concomitante di sostanze oppiacee illecite;
- 2) riduce i sintomi di astinenza;
- 3) riduce significativamente il craving;
- 4) aumenta la compliance al trattamento.

Inoltre il levometadone non influisce sull'intervallo QTc, con miglioramento del profilo di sicurezza cardiaca e, pertanto, nel caso in cui siano presenti specifiche condizioni che rappresentano dei fattori di rischio per prolungamento del tratto QT/TdP (patologie cardiache in atto, anamnesi familiare positiva per patologie cardiache, assunzione concomitante di altri farmaci con potenziale tossicità cardiaca come ad es. antivirali, antibiotici, antidepressivi e antipsicotici, HIV e epatiti, concomitante abuso di alcol e cocaina, anomalie elettrolitiche, malnutrizione e anoressia, rallentata attività enzimatica ("metabolizzatori lenti CYP2B6"), l'assunzione di levometadone cloridrato, anziché metadone racemo, conferisce al paziente una sicurezza cardiovascolare superiore.

Scopo di questa FAD è di illustrare quanto sopra e di condividere i risultati ottenuti con l'uso del levometadone nella cura del disturbo da uso di oppiacei.



ONLINE FINO AL
15 2021
Settembre

Programma Scientifico

PARTE PRIMA: LA TERAPIA DELLA COSTIPAZIONE INDOTTA DA OPIOIDI

MODULO 1 Fisiopatologia della funzione intestinale
C. Leonardi

MODULO 2 Gli antagonisti periferici del recettore mu degli oppioidi (PAMORA)
L. Somaini

MODULO 3 Approfondimenti bibliografici

PARTE SECONDA: L'USO DEL LEVOMETADONE

MODULO 4 Aspetti farmaco-clinici del levometadone
L. Somaini

MODULO 5 Dati dalla letteratura nazionale ed internazionale sull'efficacia clinica del levometadone nella cura del disturbo da uso di oppioidi
F. Auriemma

MODULO 6 La nostra esperienza
F. Auriemma

MODULO 7 Approfondimenti bibliografici



AGGIORNAMENTI NELLE TERAPIE della dipendenza da oppiacei e patologie correlate

Faculy

Claudio **Leonardi**, *Direttore Dipartimento Tutela delle Fragilità, ASL Roma 2, Roma*

Lorenzo **Somaini**, *Direttore S.C. Ser.D ASL BIELLA, Biella (TO)*

Francesco **Auriemma**, *Responsabile SerD 29, UOC Dipendenze Ovest - ASL Napoli 1 Centro*

Come si accede al corso

1 Accedere al sito www.dynamicomeducation.it

2 In caso di primo accesso cliccare sulla voce **Registrati** nella barra in alto oppure in basso nella stessa homepage del sito, completando il form di registrazione con i tuoi dati personali. Riceverai una mail di conferma automatica all'indirizzo specificato.

3 Effettua ora login/accesso alla piattaforma con i tuoi dati personali e iscriviti al corso: **AGGIORNAMENTI NELLE TERAPIE DELLA DIPENDENZA DA OPIACEI E PATOLOGIE CORRELATE** che troverai nell'elenco presente in homepage.

In caso di necessità per assistenza tecnica, cliccare il box Assistenza nella homepage del sito e completare il form o inviare una mail a: helpdeskfad@dynamiccom-education.it

ECM (Educazione Continua in Medicina)



E.C.M.

Il corso FAD asincrono 181-299975 è inserito nella lista degli eventi definitivi ECM del programma formativo 2020 del Provider

Categoria: Medico Chirurgo, Infermiere, Psicologo, Biologo, Educatore Professionale, Assistente Sanitario, Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica.

Discipline principali: tutte le discipline

Crediti assegnati: 3

Obiettivo formativo: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura.

Provider ECM ID 181

dynamicom
education

Via San Gregorio, 12 - 20124 Milano

| enrica.milani@dynamiccom-education.it | (+39) 0289693750 |

www.dynamicomeducation.it

www.sipad.network

Con il contributo educazionale incondizionato di



MOLTENI[®]
FARMACEUTICI